

Mitoxur

PROPOXUR

POLVO HUMECTANTE

70 PH

● **Recomendable para la rotación con insecticidas.**

● **Prolongada acción residual.**

● **Rápido efecto de desalojo.**

Para uso en interiores y exteriores

- Casas
- Hoteles
- Restaurantes
- Oficinas
- Hospitales
- Fabricas
- Escuelas

Controla:

- Alacranes
- Cucarachas
- Hormigas
- Chinche de chagas
- Pulgas
- Grillo doméstico
- Arañas
- Y otros rastrosos



Mitoxur

PROPOXUR
POLVO HUMECTANTE

70 PH

Se mezcla
fácilmente con agua

No tapa las boquillas

APLICACIÓN:

MITOXUR 70 PH, es un insecticida carbamato de aplicación urbana formulado como polvo humectable. Controla insectos rastreros en casas, hoteles, restaurantes, oficinas, hospitales, fábricas, escuelas, transportes, patios, áreas rurales, industria alimenticia (en áreas autorizadas), en programas de salud pública y otras construcciones. Se aplica tanto en interiores como en exteriores, piedras, grietas y hendiduras. Por su prolongada actividad residual MITOXUR 70 PH, se utiliza como alternativa de rotación con los insecticidas piretroides y organofosforados.

MITOXUR 70 PH tiene efecto prolongado sobre superficies de diferentes materiales como madera, mosaico, yeso, pintura, concreto y otros materiales.

Plagas	Dosis	Recomendaciones
<ul style="list-style-type: none">Chinche o triatomino (<i>Reduviidae</i>, <i>Triatoma infestans</i>, <i>T. palidipennis</i>, <i>T. longipennis</i>, <i>T. barberi</i>, <i>T. phyllosoma</i>)	6 g / 1 de agua	Para control en altas infestaciones y donde se requiera mayor periodo de control.
<ul style="list-style-type: none">Araña (<i>Latrodectus mactans</i>, <i>Lycosa spp</i>)Chinche de cama (<i>Cimex lectularis</i>)Cucaracha (<i>Blattella germánica</i>, <i>Periplaneta americana</i>, <i>Blattella orientalis</i>)Grillo doméstico (<i>Acheta domesticus</i>)Hormigas (<i>Solenopsis invicta</i>, <i>Monomorium minimum</i>, <i>Monomorium pharaonis</i>)Moscas (<i>Musca domestica</i>)Mosquitos (<i>Anopheles spp</i>, <i>Culex spp</i>)Pulga (<i>Ctenocephalides felis</i>, <i>Ctenocephalides canis</i>, <i>Pulex irritans</i>)Otros rastreros	3 g / 1 de agua	Aspersión: Aplicación residual en pisos, paredes, techos. Aplicación en grietas y hendiduras donde se oculta la plaga. Aplicación general y localizada.
<ul style="list-style-type: none">Recomendaciones especiales para el control de alacranes de la familia <i>Buthidae</i> (<i>Centruroides spp</i>) y chinches o triatominos.	12-20 g / 1 de agua	Superficies rústicas, especialmente con alta absorción y porosidad como adobe, barro, bajarenque, palmas, bardas de piedra.

METODO DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Con el equipo de protección puesto abra cuidadosamente el envase del producto. El producto se suspende en agua para ser aplicado en aspersores manuales y equipos eléctricos.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar este producto en áreas cerradas mientras estas se encuentren ocupadas por personas o animales.

Formulado por:

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Heriberto Frías No. 1529-703 Col. Del Valle C.P. 03100 México, D.F.

Tel. Ventas: 91 83 24 06, 07 y 08 Fax 91 83 24 20

E-MAIL tridente@prodigy.net.mx

